

# 平成27年度用 稲作栽培こよみ

直播コシヒカリ	田植準備				活着期			分けつ期			幼穂形成期				登熟期 <sup>(登熟85%以上)</sup>			収穫		土づくり		
	胚活動開始							最高分けつ期			幼穂形成期				出穂成穂揃熟 期期期							
	4月				5月			6月			7月				8月			9月				
	上	下			初	中	下	上	中	下	上	中	中	下	初	上～中		上	中	下	下	
耕作	耕起	代かき	カルパー処理	加温処理	落水	播種	除草	除草	除草	防除	溝切	中干	草刈り	①穂肥	防除	②穂肥	防除	防除	落水	刈取	土づくり	秋起こし
栽培管理	アドマイヤー水和 タチガレエース粉(乾籾種子の3%) カルパー(乾籾種子に対し等倍量)			播種2日前	播種前日の夕方落水	本田除草(播種後10日)	本田除草(播種後20日)	本田除草(ヒエが目立つ場合)	オリゼメート粒1～1.3kg(葉いもち病)	斑点米カメムシ注意	エコ追肥15kg(幼穂長7～10mm時施用)	パダン粒3～4kg(ニカメイチュウ)	エコ追肥15kg(1回目の10日後)	防除①	防除②	早期落水はしない(刈取り6～4日前を目安)	元氣3兄弟60kg		稲ワラの鋤き込み			